

## CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA IMPLANTE DENTAL CON INJERTO

No	mbre del paciente	Fecha de nacimiento	
cir rie est mé	ugía. Como miembro del equipo de tratamiento, s sgos, los beneficios y las alternativas asociadas con co, incluso la opción de rechazar el tratamiento, an	nen como objetivo ayudarlo a tomar decisiones informadas sobrese le ha informado su diagnóstico, el procedimiento planeado en el procedimiento y todo costo relacionado. Debe considerar entes de decidir si continúa o no con el procedimiento planeado tener y le dará información adicional antes de decidir si firma	o, los todo do. El
Dia	agnóstico:		
Pro	ocedimiento:		
Ор	ociones alternativas:		
Si	se debe adjuntar una corona, puente, o dentadura p	postiza al (a los) implante(s), lo hará el Dr.:	
1.	<ul> <li>incluyen, pero no se limitan a los siguientes:</li> <li>Dolor, inflamación, sangrado, infección, he raíces que puede hacer necesario reparar fisura o estiramiento de las comisuras de le mandíbula, presión o daño en las articulado.</li> </ul>	nciales relacionados con este procedimiento quirúrgico que nematomas, sanación retardada, cicatrices, daño a otros dientes r el diente o extraerlo, dientes flojos, daño a dispositivos dentale los labios, cortes dentro de la boca o en los labios, fractura de aciones de la mandíbula (articulaciones temporomandibulares), eacción alérgica o adversa a los medicamentos o materiales;	
	<ul> <li>Lesión en un nervio, que puede ocurrir por el procedimiento quirúrgico o la administración de aneste y que produce alteración o pérdida de sensibilidad, entumecimiento, dolor o alteración de los sentid rostro, las mejillas, los labios, el mentón, los dientes, las encías o la lengua (incluso pérdida del sentic gusto). Estas afecciones pueden resolverse con el paso del tiempo, pero en algunos casos pueden ser permanentes;</li> </ul>		
	Puede producirse una abertura desde la be	boca hacia las cavidades nasales o sinusales;	
	Incapacidad para colocar el implante debid	oido a la anatomía local; Falla del implante;	

Decoloración y cambios en la apariencia del tejido de las encías; Resultado cosmético insatisfactorio;

Iniciales del paciente \_\_\_\_\_

•	Fractura	de	mandíbula:

2.

Pérdida de hueso alrededor de los implantes o dientes adyacentes; comprendo que puede ser necesario un injerto de hueso.

INJERTO/ELEVACIÓN DE SENOS PARANASALES

El injerto se tomará de (una zona anatómica) o será un hueso de banco o sustituto óseo:
El injerto se colocará:
<ul> <li>Comprendo que este injerto implica riesgos potenciales adicionales que incluyen, pero no se limitan a los siguientes:</li> <li>Lesión en el nervio en el lugar del que se toma el injerto o donde se coloca el injerto que causa alteración o pérdida de sensación, entumecimiento, dolor o modificación de sentidos en los labios, el mentón, los dientes, las encías o la lengua (incluso pérdida del sentido del gusto). Estas afecciones pueden resolverse cor el paso del tiempo, pero en algunos casos pueden ser permanentes;</li> </ul>
• Pérdida, infección o rechazo del injerto o de las membranas usadas para contener el injerto;
<ul> <li>Puede producirse una abertura desde la boca hacia las cavidades nasales o sinusales;</li> </ul>
<ul> <li>Si he elegido un <u>injerto con hueso de banco o sustituto óseo</u>, comprendo que existe la posibilidad remota de contagiarme una enfermedad del hueso procesado.</li> </ul>
He elegido proceder con la(s) anestesia(s) indicada(s) a continuación.
Anestesia local
Óxido nitroso (gas hilarante)
Sedación leve
Sedación moderada
Sedación profunda (anestesia general)
Me han informado y comprendo los riesgos potenciales asociados con la anestesia que incluyen, pero no se limitan a los siguientes:

- Reacciones alérgicas o adversas a los medicamentos o materiales;
- Dolor, inflamación, enrojecimiento, irritación, entumecimiento o hematomas en el área donde se coloca la aguja IV. Por lo general, el entumecimiento o el dolor desaparecen, pero en algunos casos, pueden ser permanentes;
- Náuseas, vómitos, desorientación, confusión, falta de coordinación y, ocasionalmente, somnolencia prolongada. Algunos pacientes pueden tener conciencia de todos o algunos de los acontecimientos del procedimiento quirúrgico después de que termine;

Iniciales del paciente
------------------------

- Complicaciones cardíacas y respiratorias que pueden causar daño cerebral, accidente cerebrovascular (embolia cerebral), ataque cardíaco (paro cardíaco) o muerte;
- Dolor de garganta o ronquera si se usa un tubo de respiración.

Si he elegido <u>sedación leve, moderada o profunda (anestesia general)</u>, no he comido ni bebido nada durante al menos seis (6) horas antes del procedimiento. Comprendo que incumplir con esta condición puede poner en peligro mi vida. Como se me indicó, he tomado mis medicamentos habituales (medicamentos para la presión arterial, antibióticos, etc.) o cualquier otro medicamento que me haya dado mi médico con pequeños sorbos de agua solamente. Estoy acompañado por un adulto responsable quien me llevará al consultorio del médico y de regreso y se quedará conmigo después del procedimiento hasta que esté lo suficientemente recuperado como para poder cuidar de mí mismo. Comprendo que el efecto de los fármacos que me administran para este procedimiento puede durar 24 horas. Durante mi recuperación de la anestesia, acepto no conducir, operar maquinaria o dispositivos complejos ni tomar decisiones importantes como firmar documentos, etc.

- 3. Me han informado y comprendo que es posible que sean necesarias visitas o atención de seguimiento, evaluación adicional, tratamiento o cirugía, u hospitalización.
- 4. Responsabilidades del paciente

Comprendo que soy un miembro importante del equipo de tratamiento. Para aumentar las posibilidades de lograr resultados óptimos, he suministrado una historia clínica completa y precisa, en la que se incluyen todas las afecciones dentales y médicas pasadas y presentes, medicamentos recetados y de venta libre, toda alergia, uso de drogas recreativas y embarazo (si corresponde).

Comprendo que el uso de tabaco y alcohol es perjudicial para el éxito de mi tratamiento.

Acepto seguir todas las instrucciones que me indican en este consultorio antes y después del proce-dimiento, tomar los medicamentos según la receta, practicar una higiene bucal correcta, cumplir con todas las citas, hacer citas para consulta si surgen complicaciones y completar los cuidados necesarios. Informaré a mi médico todo problema posquirúrgico en el momento en que surja. Mi incumplimiento podría causar complicaciones, riesgos o resultados inferiores a los óptimos.

Comprendo y acepto que el médico no puede garantizar los resultados del procedimiento ni la duración del período necesario para completar mi tratamiento. He tenido tiempo suficiente para leer este documento, comprendo las declaraciones precedentes y he tenido la oportunidad de que se respondieran todas mis preguntas. Al firmar este documento, reconozco y acepto los riesgos y las complicaciones posibles del procedimiento y acepto realizármelo.

Si estoy sedado o bajo los efectos de anestesia general durante el procedimiento, autorizo al médico a modificar el procedimiento si, según su criterio profesional, es lo más conveniente para mí.

Firma del paciente o representante legal		
Nombre del paciente o representante legal en il	 mprenta/Relación	
Firma del testigo (opcional)	 Fecha	
Certifico que he explicado al paciente o al repre los riesgos conocidos, las complicaciones y las a representante legal del paciente expresaron su preguntas a mi leal saber y entender, y consider completamente lo que he explicado.	lternativas para el procedimien comprensión de la información	to propuesto. El paciente o el dada. He respondido todas las
Firma del médico	<del></del> Fecha	Iniciales del paciente